



1. Tavola di inquadramento con le aree dell'intervento complessivo (in rosso) nella ZSC ITB 010042 (rigato in nero)




2. Sotto intervento 2: Costa interessata dalle attività di deratizzazione (in rosso)




3. Sotto intervento 2: localizzazioni di pertinenza per la nidificazione di berta maggiore, berta minore e marangone dal ciuffo (dati Marine Strategy)




4. Sotto intervento 2: tracce dei viaggi di foraggiamento dell'uccello delle tempeste nidificante nella ZSC ITB 010042 (in rosso) che denotano la rilevanza internazionale della colonia del sito




5. Sotto intervento 2: tracce dei viaggi di foraggiamento della berta maggiore nidificante nella ZSC ITB 010042 (in rosso) che denotano la rilevanza internazionale della colonia del sito




6. Sotto intervento 3: areale di distribuzione attuale nel sito ITB 010042 degli habitat 9340 (in verde), 2270* (in rosa) e delle aree potenzialmente vocate alla lecceta (in nero)




7. Sotto intervento 3: aree potenziali di intervento (cerchiate in ciano)




8. Sotto intervento 4: distribuzione delle linee elettriche aeree nel sito ITB 010042 (in rosso) in relazione alla posizione del carnaio



9. Sotto intervento 4: areale del capovaccaio in Sardegna in rapporto alla distribuzione delle linee elettriche aeree nel sito ITB 010042



Sotto intervento 4: areale del grifone nella Sardegna settentrionale in rapporto alla distribuzione delle linee elettriche aeree nel sito ITB 010042



Sergio Ortu
30.09.2024
12:19:39
GMT+02:00

